








# **StymulaTor** PRZEWODNIK PO DAWKACH **WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN**






Produkt należy rozpuścić w wodzie, zgodnie z dawką podaną w tabeli - przewodnik po dawkach. Używać w odstępach czasowych, tak jak podano w tabeli lub w odstępach 7,10 i 14 dni. Nie mieszać z mydłem oraz innymi anionowymi substancjami, takimi jak większość detergentów. Przy zraszaniu liści, zwrócić uwagę na pokrycie liści rośliny od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Używać od 4 do 8 litrów na 100 m<sup>2</sup>, a przy podlewaniu roślin aż do dobrego nawodnienia ziemi. Rozpylając Prontech w szklarniach i pod osłonami, należy upewnić się, czy wentylatory lub ściany boczne są otwarte, dla prawidłowego wietrzenia.

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:  | PROBLEM                              | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                      | DAWKA |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|
|  <p><b>SŁONECZNIK</b><br/>(bez kwiatostanu)</p> | <i>Pseudomonas sp.</i>               | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Agrobacterium<br/>tumefaciens</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Erwinia caratovra</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Botrytis cinerea</i>              | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Alternaria sp.</i>                | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | Mączniak<br>rzekomy                  | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Fusarium sp.</i>                  | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | Mączniak                             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Phytophthora ssp.</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  <p><b>NAGIETEK</b></p>                         | <i>Alternaria sp.</i>                | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Fusarium<br/>oxysporum</i>        | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Verticillium sp.</i>              | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |





# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:  | PROBLEM                   | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                      | DAWKA  |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| <br><b>NAGIETEK</b>   | <i>Botrytis cinerea</i>   | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rżęsiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|  | <i>Rhizoctonia solani</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rżęsiste<br>skrapianie | 1g/l   |
| <br><b>PENTAS</b><br>(wszystkie odmiany)  | <i>Botrytis cinerea</i>   | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rżęsiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|  | <i>Phythium sp.</i>       | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rżęsiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|  | <i>Rhizoctonia solani</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rżęsiste<br>skrapianie | 1g/l   |
| <br><b>LISTIANTHUS</b>  | <i>Botrytis cinerea</i>   | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rżęsiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|  | <i>Phythium sp.</i>       | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rżęsiste<br>skrapianie | 1g/l   |
| <br><b>LANTANA POSPOLITA</b><br>(wszystkie odmiany)<br>Roślina o przewieszających<br>się pędach | <i>Phythium sp.</i>       | Co 8-10 dni                 | Rżęsiste<br>skrapianie                | 1g/l   |
|  | <i>Fusarium sp.</i>       | Co 8-10 dni                 | Rżęsiste<br>skrapianie                | 1g/l   |
| <br><b>POINSECJA,<br/>WILCZOMLECZ NADOBNY</b><br>(podczas rozmnażania<br>stale w mgietce)       | <i>Erwinia sp.</i>        | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 0,5g/l |
|  | <i>Botrytis cinerea</i>   | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 0,5g/l |
|  | <i>Phythium sp.</i>       | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 0,5g/l |
|  | <i>Rhizoctonia solani</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 0,5g/l |






# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:  | PROBLEM                            | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                      | DAWKA |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|
| <br><b>GERANIUM</b>   | <i>Xantomonas sp.</i>              | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l  |
|  | <i>Pseudomonas sp.</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l  |
| <br><b>PRZETACZNIK<br/>(wszystkie odmiany)</b>                 | Mączniak                           | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | Mączniak<br>rzekomy                | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
| <br><b>NIECIERPEK<br/>NOWOGWINEJSKI<br/>(bez kwiatostanu)</b> | <i>Phythium sp.</i>                | Co 8-10 dni                 | Rześiste<br>skrapianie                | 1g/l  |
|  | <i>Rhizoctonia solani</i>          | Co 8-10 dni                 | Rześiste<br>skrapianie                | 1g/l  |
|  | <i>Phytophthora<br/>parasitica</i> | Co 8-10 dni                 | Rześiste<br>skrapianie                | 1g/l  |
| <br><b>WERBENA, WITUŁKA<br/>(wszystkie odmiany)</b>           | Mączniak                           | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Phytophthora<br/>parasitica</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l  |
| <br><b>BARWINEK<br/>(bez kwiatostanu)</b>                     | <i>Rhizoctonia solani</i>          | Co 8-10 dni                 | Rześiste<br>skrapianie                | 1g/l  |
|  | <i>Phytophthora<br/>parasitica</i> | Co 8-10 dni                 | Rześiste<br>skrapianie                | 1g/l  |

# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN






| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:  | PROBLEM                               | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                      | DAWKA |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|
| <br><b>CYNIA</b>  | <i>Xantomonas sp.</i>                 | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l  |
| <br><b>DĄBRÓWKA ROZŁOGOWA,<br/>ŻURAWKA OLBRZYMIA<br/>(okrywowa)</b> | Mączniak                              | Co 8-10 dni                 | Rzęsiste<br>skrapianie                | 1g/l  |
| <br><b>GOŹDZIKOWIEC</b>   | <i>Cercospora eugeniae</i>            | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rzęsiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Helminthosporium sp.</i>           | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rzęsiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rzęsiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Rhizoctonia solani</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rzęsiste<br>skrapianie | 1g/l  |
| <br><b>GERBERA</b>  | <i>Ralstonia sp.</i>                  | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rzęsiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Pseudomonas sp.</i>                | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rzęsiste<br>skrapianie | 1g/l  |
|  | <i>Botrytis cinerea</i>               | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rzęsiste<br>skrapianie | 1g/l  |

# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN





| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:   | PROBLEM                | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                      | DAWKA  |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| <br><b>GERBERA</b>   | <i>Alternaria sp.</i>  | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|   | <i>Fusarium sp.</i>    | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
| <br><b>OŁOWNICA</b>  | Mączniak               | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
| <br><b>MACHO FERN,<br/>NEPHROLEPIS BISERRATA,<br/>NEFROLEPIS<br/>(wszystkie odmiany)</b> | <i>Erwinia sp.</i>     | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Xanthomonas sp.</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Pseudomonas sp.</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
| <br><b>SWORD FERN</b>  | <i>Erwinia sp.</i>     | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
| <br><b>NEPHROLEPIS<br/>EXALTATA, NEFROLEPIS<br/>WYNIOSŁY<br/>(wszystkie odmiany)</b>     | <i>Xanthomonas sp.</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Pseudomonas sp.</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |





# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:   | PROBLEM                     | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                      | DAWKA  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| <br><b>PIERWIOSNKA<br/>ŁYSZCZAK</b>  | <i>Pseudomonas sp.</i>      | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l   |
|   | <i>Botrytis cinerea</i>     | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l   |
| <br><b>PHILODENDRON<br/>XANADU</b>  | <i>Erwinia sp.</i>          | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Xanthomonas sp.</i>      | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Pseudomonas sp.</i>      | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
| <br><b>INDIAN HAWTHORNE<br/>(RAPHIOLEPSIS<br/>INDICA), GŁÓG INDYJSKI</b> | <i>Erwinia sp.</i>          | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Xanthomonas sp.</i>      | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Pseudomonas sp.</i>      | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
| <br><b>KETMIA, HIBISKUS</b>  | <i>Botrytis cinerea</i>     | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l   |
|   | <i>Erwinia sp.</i>          | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l   |
|   | <i>Xanthomonas sp.</i>      | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l   |
|   | <i>Pseudomonas sp.</i>      | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1g/l   |
| <br><b>PALMA KRÓLEWSKA,<br/>PALMA AREKA</b>                              | <i>Helminthosporium sp.</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1,5g/l |
|   | <i>Erwinia spp.</i>         | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1,5g/l |

# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN





| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:   | PROBLEM                            | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                      | DAWKA  |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| <br><b>PALMA KRÓLEWSKA,<br/>PALMA AREKA</b>  | <i>Fusarium spp.</i>               | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1,5g/l |
|   | <i>Phytophthora<br/>parasitica</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1,5g/l |
|   | <i>Phythium sp.</i>                | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1,5g/l |
| <br><b>CHRYZANTEMA</b>   | <i>Alternaria sp.</i>              | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|   | <i>Pseudomonas sp.</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|   | <i>Fusarium sp.</i>                | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|   | <i>Phytophthora<br/>parasitica</i> | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
|   | <i>Phythium sp.</i>                | Co 8-10 dni                 | Zraszanie<br>i rześiste<br>skrapianie | 1g/l   |
| <br><b>KALINA</b>  | <i>Erwinia sp.</i>                 | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Xanthomonas sp.</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Pseudomonas sp.</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
| <br><b>FILODENDRON, PHILODENDRON<br/>BIPINNATIFIDUM<br/>(PHILODENDRON SELLOUM)</b> | <i>Erwinia sp.</i>                 | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |
|   | <i>Xanthomonas sp.</i>             | Co 8-10 dni                 | Zraszanie                             | 1,5g/l |

# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN




| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:   | PROBLEM                          | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA    | DAWKA        |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| FILODENDRON, PHILODENDRON<br>BIPINNATIFIDUM<br>(PHILODENDRON SELLOUM)   | <i>Pseudomonas sp.</i>           | Co 8-10 dni                 | Zraszanie           | 1,5g/l       |
|  <p>GOŹDZIK OGRODOWY<br/>(DIANTUS CARYOPHYLLUS)</p> | <i>Fusarium oxysporum</i>        | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 4g/l         |
|   | <i>Fusarium roseum</i>           | Co 5 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l         |
|   | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 1,5 - 1g/l   |
|   | <i>Cladosporium echinulatum</i>  | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 1g/l         |
|   | <i>Alternaria sp.</i>            | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l         |
|   | <i>Phythium sp.</i>              | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|   | <i>Rhizoctonia sp.</i>           | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|  <p>RÓŻA</p>                                       | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l   |
|   | <i>Rhizoctonia sp.</i>           | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|   | <i>Oidium sp.</i>                | Co 4 - 8 dni                | Rzęsiste skrapianie | 1g/l         |
|   | <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | 1 raz                       | Zraszanie           | 2g/l         |
|   | <i>Phythium</i>                  | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|   | <i>Spaeroteca pannosa</i>        | Co 7 dni                    | Zraszanie           | 0,5 - 1,5g/l |







# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:   | PROBLEM                          | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA    | DAWKA        |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|  <p><b>CHRYZANTEMA<br/>(CHRYSANTHEMUM<br/>MORIFOLIUM)</b></p>            | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l   |
|   | <i>Alternaria sp.</i>            | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 1,5 - 2g/l   |
|   | <i>Phythium sp.</i>              | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|   | <i>Pseudomonas cichorii</i>      | Co 15 dni                   | Rzęsiste skrapianie | 1 - 1,5g/l   |
|  <p><b>CHRYZANTEMA<br/>BIAŁA</b></p>                                    | <i>Puccinia horiana</i>          | 4 razy przez 7 dni          | Zraszanie           | 0,5 - 1,5g/l |
|  <p><b>ŁYSZCZEC<br/>WIECHOWATY<br/>(GYPSOPHILA<br/>PANICULATA)</b></p> | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l   |
|   | <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | 1 raz                       | Zraszanie           | 2g/l         |
|   | <i>Erwinia carotovora</i>        | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|  <p><b>ZATRWIAN<br/>(LIMONIUM SP.)</b></p>                             | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l   |
|   | <i>Phythium sp.</i>              | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|   | <i>Rhizoctonia sp.</i>           | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |



# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:  | PROBLEM                          | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA    | DAWKA        |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| <br><b>ASTER CHIŃSKI<br/>(CALISTEPHUS<br/>CHINESIS)</b> | <i>Fusarium roseum</i>           | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l         |
|  | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l   |
|  | <i>Oidium sp.</i>                | Co 4 - 8 dni                | Rzęsiste skrapianie | 1g/l         |
|  | <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | Co 1 raz                    | Zraszanie           | 2g/l         |
| <br><b>GERBERA<br/>(GERBERA JAMESOWI)</b>             | <i>Fusarium roseum</i>           | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l         |
|  | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1/l    |
|  | <i>Phythium sp.</i>              | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|  | <i>Rhizoctonia sp.</i>           | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|  | <i>Pseudomonas cichorii</i>      | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 1 - 1,5g/l   |
|  | <i>Xanthomonas sp.</i>           | Co 15 dni                   | Rzęsiste skrapianie | 1 - 1,5g/l   |
|  | <i>Phytophthora cryptogea</i>    | Co 8 - 10 dni               | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1,5g/l |
| <br><b>ALSTROMERIA<br/>(ALSTROMERIA SP.)</b>          | <i>Botrytis cinerea</i>          | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1/l    |
|  | <i>Phyitium sp.</i>              | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |
|  | <i>Rhizoctonia sp.</i>           | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l         |

# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:   | PROBLEM                 | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA    | DAWKA      |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| <br><b>WYŻLIN WIĘKSZY<br/>(ANTIRRHINUM MAJUS)</b>                     | <i>Botrytis cinerea</i> | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l |
|   | <i>Alternaria sp.</i>   | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l       |
|   | <i>Phythium sp.</i>     | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |
|   | <i>Rhizoctonia sp.</i>  | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |
| <br><b>OSTRÓZEK<br/>(DELPHINIUM SP.)</b>                             | <i>Botrytis cinerea</i> | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l |
|   | <i>Alternaria sp.</i>   | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l       |
|   | <i>Phythium sp.</i>     | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |
|   | <i>Rhizoctonia sp.</i>  | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |
| <br><b>TRACHELIUM<br/>NIEBESKAWE<br/>(TRACHELIUM<br/>CAERULEUM)</b> | <i>Botrytis cinerea</i> | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l |
|   | <i>Alternaria sp.</i>   | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l       |
|   | <i>Phythium sp.</i>     | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |
|   | <i>Rhizoctonia sp.</i>  | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |
| <br><b>LEWKONIA<br/>(MATTHIOLA SP.)</b>                             | <i>Botrytis cinerea</i> | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 0,5 - 1g/l |
|   | <i>Alternaria sp.</i>   | Co 8 dni                    | Rzęsiste skrapianie | 2g/l       |
|   | <i>Phythium sp.</i>     | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |
|   | <i>Rhizoctonia sp.</i>  | Co 15 dni                   | Zraszanie           | 2g/l       |

# Stymulator WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

| RODZAJ ROŚLINY<br>OZDOBNEJ:  | PROBLEM                       | CZĘSTOTLIWOŚĆ<br>STOSOWANIA | SPOSÓB<br>UŻYCIA                              | DAWKA        |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| <br><b>ANTURIUM<br/>(ANYTURIUM SP.)</b> | <i>Xanthomonas campestris</i> | Co 15 dni                   | Rzęsiste skrapianie                           | 1 - 1,5g/l   |
|  | <i>Xanthomonas anthuriae</i>  | Co 7 dni                    | Rzęsiste skrapianie                           | 1 - 1,5g/l   |
| <br><b>NIECIERPEK</b>                  | <i>Myrothecium Roridum</i>    | 2 razy przez 10 dni         | Zraszanie                                     | 0,5 - 1,5g/l |
| <b>KWIATY CIĘTE</b>  | Bakteria, grzyb               | 1 raz                       | Zanurzać łodygi<br>1 - 2 godziny              | 0,5g/l       |
| <b>DEZYNFEKCJA<br/>GATUNKI<br/>KULTUR KWIATOWYCH</b>   | Bakteria, grzyb               | 1 raz                       | Zanurzyć<br>w roztworze<br>przez<br>30 sekund | 1g/l         |

| PATOGENY  | DAWKA                                    | SPOSÓB<br>DOZOWANIA | OKRESY STOSOWANIA               |
|---|--|---------------------|---------------------------------|
| <b>SCLERATINIA SP. –<br/>DOLLAR SPOT</b>                          | 2g/l (zapobiegawczo)<br>4g/l (leczniczo) | Zraszanie           | 10 - 14 dni                     |
| <b>RHIZOCTONIA SP. –<br/>BROWN PATCH</b>                          | 2g/l (zapobiegawczo)<br>4g/l (leczniczo) | Zraszanie           | 10 - 14 dni                     |
| <b>PHYTHIUM SP.</b>   | 2g/l (zapobiegawczo)<br>4g/l (leczniczo) | Zraszanie           | 10 - 14 dni                     |
| <b>ZESPÓŁ PLAMEK<br/>CHOROBYCHYCH –<br/>PATCH DISEASE COMPLEX</b> | 4g/l (1 oz. / M)                         | Zraszanie           | 7 - 14 dni,<br>w razie potrzeby |
| <b>XANTHOMONAS SP.</b>  | 1,5g/l                                   | Zraszanie           | 10 - 14 dni                     |
| <b>PSEUDOMONAS SP.</b>  | 1,5g/l                                   | Zraszanie           | 10 - 14 dni                     |
| <b>OMSZENIE</b>   | 2g/l                                     | Zraszanie           | 7 dni                           |
| <b>ALGI</b>   | 1g/l                                     | Zraszanie           | 7 dni                           |