

Omnicide™

For Complete Bio-Security

DRÓB

Oryginalny środek
dezynfekujący o szerokim
spektrum działania,
zawierający glutaraldehyd
i alkilodimetyl
benzylokokosowy.



Omnicide™

For Complete Bio-Security

Omnicide™ to oryginalna synergiczna mieszanka glutaraldehydu i amonu czwartorzędowego, wykorzystująca alkilodimetyl benzylokokosowy odkryty przez Coventry Chemicals Ltd. Od ponad 30 lat preparat Omnicide™ jest liderem i wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa biologicznego we wszystkich rodzajach ferm drobiu. Preparat Omnicide™ może być stosowany we wszystkich obszarach produkcji drobiu (w zależności od lokalnego ustawodawstwa). Nie wymaga systemu rotacyjnego i pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na inne produkty w gospodarstwie.

- Dezynfekcja wszystkich obszarów produkcji drobiu i wylęgarni
- Zatwierdzony i uznany przez rządy na całym świecie
- Udowodniona długotrwała aktywność resztkowa
- Idealny środek dezynfekujący po zastosowaniu preparatu Omniclean™
- Skuteczne zwalczanie wirusów, bakterii, grzybów i pleśni
- Po rozcieńczeniu nie powoduje korozji
- Aktywny w obecności materii organicznej
- Szybkie działanie
- Skuteczny zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach



Udowodnione działanie
przeciwko
**A/H5
i H9**



Wszystkie środki dezynfekujące działają najskuteczniej na czystej, suchej powierzchni.

Celem wszystkich programów bezpieczeństwa biologicznego jest znaczne zmniejszenie obciążenia drobnoustrojami przed zastosowaniem środka dezynfekującego.



GOSPODARSTWO

Ściany, podłogi, sprzęt – preparat Omnicide™ może być stosowany na wszystkich czystych powierzchniach na końcowym etapie dezynfekcji w rozcieńczeniu 1:125 po zastosowaniu preparatu Omniclean™ lub OmniGel™. (Zatwierdzony przez DEFRA w przypadku chorób drobiu) Może być stosowany przy użyciu lancy myjącej pod niskim ciśnieniem. W przypadku użycia lancy spieniącej produkt wytworzy lekką pianę pokrywającą wszystkie powierzchnie, zapewniając dłuższy czas kontaktu i widoczne pokrycie.

Pojemniki do dezynfekcji obuwia – powinny być odpowiednio dobrane, najlepiej kryte – aby ochronić środek dezynfekujący przed deszczem i promieniowaniem słonecznym. Ich zawartość powinna być wymieniana co 2-3 dni. Przed przystąpieniem do dezynfekcji obuwia należy zawsze oczyścić obuwie z wszelkich substancji organicznych. Preparat Omnicide™ należy dodawać do pojemnika do dezynfekcji obuwia w rozcieńczeniu 1:100.

Poidła – preparat Omnicide™ może być z powodzeniem stosowany na końcowym etapie czyszczenia linii poidła. Do usuwania osadów i biofilmu. Najpierw należy opróżnić system. Dodać rozcieńczony preparat Omnicide™ do całego systemu w proporcji 1:150. Pozostawić na co najmniej jedną godzinę. Opróżnić system i splukać czystą wodą.

Fumigacja – Na końcowym etapie dezynfekcji preparat Omnicide™ jest bezpiecznym fumigantem stanowiącym alternatywę dla formaldehydu wewnątrz budynku. Może być stosowany do zamglawiania na zimno / zraszania lub do zamglawiania termicznego. Omnicide™ nie wymaga dodawania środka zamglawiającego.

Płytki ewaporacyjne wymiennika – Czyszczenie i dezynfekcja systemu płytek ewaporacyjnych wymiennika ma ogromne znaczenie. W systemie wody może tworzyć się biofilm blokujący płytki, które stają się wówczas siedliskiem chorobotwórczych bakterii. W obszarach nośnych zaleca się dokładne czyszczenie systemu pod koniec każdej partii i co kwartał.

Jak czyścić gospodarstwo

1. Usunąć wszelkie substancje organiczne z budynku i z gospodarstwa w krytych pojazdach.
2. Wymieść cały pył i materiał z belek, wałów wentylatorów wlotów powietrza itp., zaczynając od górnej części budynku i przemieszczając się w dół, w stronę podłogi i z jednej strony na drugą.
3. Spuścić wodę i oczyścić system preparatem Omnicide™ w rozcieńczeniu 1:150. Pozostawić na 3 godziny. Opróżnić system odpływowi i splukać czystą wodą pitną.
4. Zwilżyć wstępnie wszystkie powierzchnie i sprzęt preparatem Omniclean™ lub OmniGel™ przy pomocy lancy spieniącej w rozcieńczeniu 1-2%. I 5% w przypadku OmniGel™. Zaczynając od podłogi i przesuwać się w górę.
5. Pozostawić do namoczenia na 15 minut. Zmyć czystą wodą pod ciśnieniem. Zaczynając od dachu i przesuwając się w dół w stronę podłogi i z jednej strony na drugą.
6. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
7. Nałożyć preparat Omnicide™ pod małym ciśnieniem w rozcieńczeniu 1:125 na wszystkie powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia.
8. Zainstalować pojemnik do dezynfekcji obuwia przy wejściu do pomieszczenia i wnieść z powrotem do pomieszczenia czysty, zdezynfekowany sprzęt.
9. Rozsypać czystą ściółkę lub ponownie zainstalować listwy. Następnie przeprowadzić fumigację pomieszczenia przy pomocy zamglawiania na zimno lub zamglawiania termicznego.

Uwaga: Powyższy program ma charakter wskazówki. Ponieważ występują różnice między gospodarstwami. W celu ustalenia indywidualnych wymogów należy skontaktować się z producentem.



Pojazdy – preparat Omnicide™ świetnie nadaje się jako płyn do spryskiwania pojazdów. Jest niekorozyjny, działa szybko i wykazuje działanie resztkowe. Wszystkie pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z gospodarstwa powinny być dokładnie spryskane, szczególnie w okolicach nadkoli. W spryskiwaczach preparat należy stosować w rozcieńczeniu 1:125, a do dezynfekcji kół w rozcieńczeniu 1:100 (zmieniać roztwór co 2-3 dni lub gdy występują duże ilości materii organicznej i po silnym deszczu).

Ściółka – preparat Omnicide™ może być rozpylany na ściółkę (wióry drzewne, sieczka, łuska ryżowa itp.) na etapie dezynfekcji końcowej. Nanieść preparat Omnicide™ przy pomocy spryskiwacza w rozcieńczeniu 1:125, lekko zwilżając ściółkę. Nie moczyć.

Wylęgarnie – w wylęgarni zawsze należy przestrzegać ścisłych zasad bezpieczeństwa biologicznego i czystości. Szybkie działanie, niewywoływanie korozji wrażliwego sprzętu i długi okres działania resztkowego sprawia, że preparat Omnicide™ idealnie sprawdza się do dezynfekcji wszystkich obszarów w obrębie wylęgarni – począwszy od obszaru przechowywania jaj, poprzez systemy ustawiania, klujniki, obszary przenoszenia i wysyłki kurcząt. Po dokładnym oczyszczeniu zastosować preparat Omnicide™ pod niskim ciśnieniem na wszystkich powierzchniach w rozcieńczeniu 1:125.

Zaplodnione jaja lęgowe – Ważne jest, aby na złożonych jajach znajdowała się jak najmniejsza ilość zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Nie chodzi tylko o produkcję silnych, zdrowych piskląt. Ale aby uniknąć „elementów objajających” w maszynach, które zanieczyszczają dużą liczbę jaj. Jaja powinny być sterylizowane jak najszybciej po zniesieniu i przed schłodzeniem. Preparat Omnicide™ może być z powodzeniem stosowany jako roztwór do zanurzania, spryskiwania lub zamglawiania jajek. Preparat Omnicide™ jest bezpieczną alternatywą dla gazu formaldehydowego i może być również stosowany w zamglawiaczu termicznym do produkcji suchego gazu. (w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tej metody należy skontaktować się z dystrybutorem lub personelem technicznym firmy Mirius™).

Rzeźnie – Omnicide™ jest idealnym środkiem dezynfekującym do stosowania po zastosowaniu Omniclean™ w rzeźniach drobiu. Preparat można nałożyć na wszystkie powierzchnie, szkle itp. w rozcieńczeniu 1:150 przy niskim ciśnieniu i pozostawić do wyschnięcia. Na stoły i inne powierzchnie spożywcze. Powierzchnia powinna zostać splukana wodą pitną po 30 minutach.

Tabele zastosowania produktu:

Omnicide™

Ten środek dezynfekujący został zatwierdzony przez Defra do dezynfekcji powierzchni nieożywionych, w przypadku gdy stosowany produkt musi być zgodny z przepisami w zakresie kontroli dotyczącymi następujących specyficznych chorób:

Pryszczycza	1: 60
Choroba pęcherzykowa świń	1:100
Ptasia grypa	1:125
Rzekomy pomór drobiu	1:125
Paramyksowirus	1:125

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, w temperaturze od 5 do 30°C z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Aby uzyskać informacje dotyczące szczegółowych badań skuteczności przeciwko innym organizmom należy skontaktować się z producentem.

Pojemniki do dezynfekcji obuwia

Dezynfekcja	Współczynnik rozcieńczenia	Zastosowanie
Rutynowa dezynfekcja obuwia	1:100	Roztwór należy wymieniać co 3 dni lub jeśli został zabrudzony lub rozcieńczony.

Dezynfekcja drogą powietrzną - zraszanie / zamgławianie na zimno / zamgławianie termiczne

Dezynfekcja sprzętu	Współczynnik rozcieńczenia	Zastosowanie
Zamgławianie na zimno	1:9	Za pomocą zraszacza drobnokroplistego rozpylać roztwór w ilości 9 litrów na 1000 m ² powierzchni podłogi.
Zamgławiacze termiczne	1:4	Za pomocą zamgławiacza termicznego rozpylać roztwór w ilości 9 litrów na 1000 m ² .
Zraszanie	1:125	Używając myjki ciśnieniowej lub opryskiwacza plecakowego, ustawić na najdrobniejsze kropelki i nanieść 1 litr roztworu Omnicide™ na 10 m ² powierzchni podłogi.

Dezynfekcja wody

Dezynfekcja systemu wodnego	Współczynnik rozcieńczenia	Zastosowanie
Dezynfekcja terminala	1:150	Najpierw należy opróżnić system. Do całego układu dodać roztwór rozcieńczonego preparatu Omnicide. Pozostawić na 3 godziny. Opróżnić układ i spłukać czystą wodą.
Ciągła dezynfekcja	1:3000	Stosować codziennie poprzez odpowiedni system dozowania. Usunąć na 24-48 godzin przed podaniem żywej szczepionki.

Ilości Omnicide™ potrzebne w pomieszczeniach dla zwierząt: Współczynnik rozcieńczenia Omnicide™

Powierzchnia podłogi w stopach kwadratowych	Powierzchnia całkowita w metrach kwadratowych	Współczynnik rozcieńczenia	Koncentrat użyty na powierzchni nieporowatej (100 ml na m ²)	Koncentrat użyty na powierzchni porowatej (300 ml na m ²)	Ogółem koncentrat użyty na powierzchni nieporowatej (Litry)	Ogółem koncentrat użyty na powierzchni porowatej (Litry)
5000	1161	1:50	2 ml	6 ml	2,35	7,00
10000	2325	1:50	2 ml	6 ml	4,65	14,00
15000	3487	1:50	2 ml	6 ml	7,00	21,00
20000	4650	1:50	2 ml	6 ml	9,30	28,00
5000	1161	1:100	1 ml	3 ml	1,15	3,48
10000	2325	1:100	1 ml	3 ml	2,32	6,96
15000	3487	1:100	1 ml	3 ml	3,49	10,46
20000	4650	1:100	1 ml	3 ml	4,65	13,95
5000	1161	1:150	0,66 ml	2 ml	0,77	2,35
10000	2325	1:150	0,66 ml	2 ml	1,53	4,65
15000	3487	1:150	0,66 ml	2 ml	2,30	7,00
20000	4650	1:150	0,66 ml	2 ml	3,10	9,30
5000	1161	1:300	0,33 ml	1 ml	0,38	1,16
10000	2325	1:300	0,33 ml	1 ml	0,78	2,32
15000	3487	1:300	0,33 ml	1 ml	1,15	3,46
20000	4650	1:300	0,33 ml	1 ml	1,53	4,65

Distyrybutor:
Medipharm International Sp. z o.o. Sp. k.
ul. E. Szczywieckiej 20b
64-316 Kuślin

☎ 604-421-457 - sprzedaż
602-510-498 - sprzedaż
608-389-798 - sprzedaż
61-44-12-202 - biuro/sprzedaż/konsultacje

🌐 www.medipharm.info.pl /
www.prontech.pl
✉ medipharm@medipharm.info.pl